

瘻管或人工瘻管流血： 應如何處理

離開透析室之後瘻管或人工瘻管流血的情況十分罕見。此手冊告訴您，萬一出現這種情況時該怎樣做。


需準備哪些物品，以防在家發生透析注射部位流血的情況？

- 紗布
- 膠帶
- 手套
- 止血帶（如：腰帶、領帶、血壓袖帶等 — 僅在大量或呈噴射狀出血時需要）。

將這些物品放於急救包內。

若我的瘻管或人工瘻管在離開透析室後 開始流血，該如何處理？

1. 打電話求助！讓家人、朋友、或鄰居知道。
2. 拿出急救包，戴上手套，打開紗布。若無紗布，可用一塊吸水布、衛生紙、紙巾等。
3. 緊壓 10-15 分鐘，其間切勿鬆開手指窺看流血處。
4. 務必用兩隻手指壓住流血的針眼處，同時施壓於針頭進入皮膚處以及進入瘻管/人工瘻管處。
5. 若流血停止，貼一張藥水膠布（下次去透析時將情況告知護士）。
6. 若 15 分鐘後仍流血不止，致電 911。
7. 抬高瘻管/人工瘻管那條手臂。
8. 若大量或呈噴射狀流血，用一條止血帶（腰帶、領帶、血壓袖帶等）緊緊綁住上臂，同時等候救護車 到來。



如何施壓於針眼
紗布
用 2 只手指
瘻管/人工瘻管進針處

此手冊內的信息旨在提供教育與資訊，及為您與醫療團隊探討病情與治療提供便利，而不可等同於醫學建議，亦不能替代您的醫生或其他專業醫療人員之意見。此手冊可於卑詩省腎臟中心的網站：www.bcrenalagency.ca 下載