

# ਫਿਸਟੂਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਧਮਣੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ Ways to Prevent Aneurysms in Fistulas & Grafts



## ਧਮਣੀ ਦੀ ਫੁਲਾਵਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਧਮਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ।

## ਧਮਣੀ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?


ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।



## ਧਮਣੀ ਦੀ ਫੁਲਾਵਟ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ?



ਧਮਣੀ ਦੀ ਫੁਲਾਵਟ:

- ਚਮੜੀ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਚਮੜੀ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੂਈਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਧਮਣੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇਦ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



## ਧਮਣੀ ਦੀ ਫੁਲਾਵਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

1. ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ (ਇਸ ਨੂੰ “ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਣਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ →
2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕ੍ਰੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੂਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
4. ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੂਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
5. ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੇਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੇਪ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 4-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੋਜ਼ ਉਤਾਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੇਦ ਉੱਪਰ ਖਰਿੰਢ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਖਰਿੰਢ ਉੱਪਰ ਖਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰਿੰਢ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।



ਸੂਈ ਦੇ ਛੇਦ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ